



DENGUE

Canal Endémico de Dengue, desde la semana 1
Bolivia 2005-2008



Casos sospechosos de Dengue clásico por departamentos.
Hasta semana 8, Bolivia 2008



En la semana reportaron 145 casos sospechosos de Dengue Clásico en: Cochabamba (74), Santa Cruz (38), Pando (15), Beni (14), Tarija (2) y La Paz (2). Se acumulan 791 casos sospechosos a nivel nacional.

Hasta la fecha se confirmaron 321 casos de dengue clásico a nivel nacional.


Se reportó 2 casos sospechosos de Dengue hemorrágico en Santa Cruz.

IRAS SIN NEUMONÍAS

En la semana se reportaron 31.776 episodios de IRA sin neumonía en todas las edades. Santa Cruz notificó el 26% de los casos (8.229 atenciones). Se acumulan 205.535 episodios hasta la fecha. Las mayores tasas acumuladas se observan en Tarija (3810×10^5 hab.) y Oruro (3658×10^5 hab.).

El 73% de los episodios de IRA sin neumonía se presentaron en personas menores de 14 años a nivel nacional.

Canal Endémico de IRAs, desde la semana 1
Bolivia 2005-2008



NEUMONÍAS


En la semana se notificaron 2.112 casos de neumonía en todas las edades. El 30% de los episodios reportados corresponden a Santa Cruz (624 casos).

Hasta la fecha se han acumulado 14.007 episodios reportados a nivel nacional. Pando presenta la mas alta tasa de neumonías (494×10^5 hab.), seguido por Oruro (307×10^5 hab.).

El 84% de los episodios de neumonía se presentaron en personas menores de 14 años a nivel nacional.

ENFERMEDADES DIARREICAS

Canal Endémico de EDAs, desde la semana 1
Bolivia 2005-2008



El número de casos por diarreas durante esta semana fue de 12.859 episodios, de los cuales el 23% de los casos corresponden a Santa Cruz (2.926 casos); el departamento con menos episodios notificados en esta semana fue Pando (140). El 74% de los episodios se presentaron en niños menores de 5 años. Tarija presentó 50% de episodios de diarreas en personas mayores de 5 años.

Se acumulan 96.198 episodios a nivel nacional. Las mayores tasas se observan en Chuquisaca (1994×10^5 hab.) y Oruro (1796×10^5 hab.).


MALARIA

En la semana se reportaron 825 casos sospechosos de Malaria, en Beni (748), Chuquisaca (29), Pando (20), Santa Cruz (17), Cochabamba (9) y La Paz (2).

La tasa de incidencia es de 63×10^5 hab. a nivel nacional.

El departamento de Beni tiene la mayor tasa del país con 1329×10^5 hab.

Incidencia de Malaria por Departamentos
Hasta semana 8. Bolivia. 2008



Fuente: SNIS Nivel Central